



مضبوط سفید پھول وزن بھی خوب ہائبرڈ پھول گوبھی CFH-1522



سنجینٹا پاکستان لمیٹڈ

کراچی

15th فلور، التجارہ ہینئر، 132-اے، بلاک 6،

پی ای سی ایچ ایس، مین شاہراہ فیصل، کراچی۔ 75400

فون: 38677200 (021)

فیکس: 38677220 (021)

ملتان

لاہور

مشیخ کوئلہ ایوانج ہنزدا انڈسٹریل اےریٹ آف بائی پاس روڈ، ملتان۔

فون: 6539638 / 6537073 / 9 / 6537073 (061)

فیکس: 6539660 (061)

رحیم یار خان ویئر ہاؤس

پلاٹ نمبر اے-24-اے-1، سائٹ ایریا، حیدر آباد۔

فون: 022-3885046

فون: 0316-6888284 / 0316-6888285

فون: 0316-6888286

ساہیوال

۸ کے ایم ملتان روڈ، ساہیوال

فون: 5002726 / 5002727 / 5002736 (040)

فیکس: 4225362 (040)



Toll Free: **080023567**

[SyngentaSeeds](#) [SyngentaPakistan](#)

pkinfo@syngenta.com




Cropwise
Grower



سنجینٹا کے تمام بیج نیاسویرا اور
منتخب ڈیلرز کے پاس دستیاب ہیں

نیاسویرا

نوٹ: کپنی صرف بیج کے اگڑ اور خاص پن کی ضمانت دیتی ہے۔ پیداوار کا انحصار بہت
سارے قدرتی عوامل پر منحصر ہوتا ہے۔ جس کے لیے کپنی ذمہ دار نہیں۔



CFH-1522

syngenta®

ہم بیج نہیں امید بوتے ہیں

یہ کتابچہ/مواد پہلے سے موجود تمام پروڈکٹ بروشرز/لٹریچر کی جگہ لے گا۔

© Syngenta Participations AG Basel, Switzerland
© 2023 Syngenta

TM


ہائبرڈ پھول گوبھی CFH-1522

خصوصیات

- کریمی سفید، خوبصورت اور انتہائی گھوندے ہوئے پھول۔
- پھل کا اوسط وزن 950 تا 1250 گرام۔
- 60 سے 65 دن میں برداشت کے لیے تیار (موسمی حالات کی وجہ سے دنوں میں کمی بیشی ہو سکتی ہے)۔
- روایتی اقسام کے مقابلہ میں زیادہ پیداواری صلاحیت اور زیادہ قابل فروخت پھول کا حصول۔
- 4-5 چنائیوں میں فصل کی مکمل برداشت۔

بہترین ہاروسٹ انڈکس:

روایتی بیج کے مقابلے میں دو گنا زیادہ کامیاب پھول بنانے کی صلاحیت۔



وقت کاشت:

موسمی کاشت کے لیے:

پنجاب	آخر جون تا اگست پہلا ہفتہ
کے پی کے	اوائل جون تا آخر جولائی
سندھ	جولائی

اگیتی کاشت کے لیے:


پنجاب	وسط فروری سے مارچ کے وسط تک
سندھ	وسط فروری سے مارچ کے وسط تک

پودوں کی تعداد: 18000 سے 20000 صحت مند پودے فی ایکڑ
شرح بیج: 140 تا 150 گرام فی ایکڑ، 14 سے 15 پیک

طریقہ کاشت:

پھول گو بھی کی کاشت کے لیے براہ راست بجائی کا طریقہ بھی مشتمل ہے، لیکن گو بھی کی کاشت بذریعہ پنیری سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ پنیری کی کاشت بیڈز یا نرسری ٹریز میں کی جاسکتی ہے۔ جس کے مندرجہ ذیل فوائد ہیں:

- بیج کی کم مقدار استعمال ہوتی ہے۔
- بیج کا بہتر اگاؤ کی وجہ سے 90% سے زیادہ جرمنیشن۔
- ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقلی آسان۔
- بیک وقت ایک جیسے صحت مند پودوں کا حصول۔
- سپرنکلر ایریگیشن کی وجہ سے پانی کا کم استعمال۔
- ڈائریکٹ بجائی کے مقابلے میں نرسری لگانے کا 3 گنا کم خرچہ۔



CFH-1522

syngenta®

پنیری کی کاشت کا طریقہ اور دیکھ بھال

- زرخیز زمین کا انتخاب کریں۔
- زمین کی تیاری کے بعد 6 انچ اونچا 1 میٹر چوڑا اور 3 میٹر لمبا بیڈ تیار کریں۔
- 1 ایکڑ کے لیے 10 سے 12 بیڈز کی ضرورت ہوگی۔
- پنیری کی کاشت کیلئے لائن سے لائن کا فاصلہ 8 تا 10 سینٹی میٹر جبکہ بیج سے بیج کا فاصلہ 3 تا 4 سینٹی میٹر رکھیں۔
- اگاؤ تک صبح شام نوارے سے پانی لگائیں۔
- بیج لگانے کے بعد پرالی یا پیٹ سن کی بوری سے ڈھانپ دیں اور جب اگاؤ مکمل ہو جائے تو ہٹادیں۔
- پنیری کو کھاد کا چھٹہ دینے سے گریز کریں۔
- پنیری کو سخت گرمی اور دھوپ سے بچانے کے لیے گرین شیٹ (50%) کا استعمال کریں۔
- پنیری منتقل کرنے سے 3 دن پہلے 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے شام کو دھوپ لگوائیں اور پانی کا استعمال بتدریج کم کر دیں۔

پنیری کی منتقلی

- زرخیز بجائی کے 20 سے 25 دن کے اندر یا 4 سے 6 پتوں کی حالت پر منتقل کریں۔
- منتقلی کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ زمین میں پودے کی جڑیں سیدھی ہوں۔
- پنیری کو منتقلی کے دوران نمدار جگہ اور سائے میں رکھیں۔
- کھیت میں پودے سے پودے کا فاصلہ 1 سے 1.5 فٹ جبکہ لائن سے لائن کا فاصلہ 2 سے 2.5 فٹ رکھیں۔

کھادوں کا استعمال فی ایکڑ

اگیتی قسم کی گو بھی کے لیے بروقت کھادوں کا استعمال انتہائی ضروری ہے۔ اس سلسلہ میں CFH-1522 کے لیے مندرجہ ذیل سفارشات کو مد نظر رکھیں۔

وقت استعمال	فاسفورس	پوٹاش	نائٹروجن
زمین کی تیاری کے وقت	1 سے 1.5 بوری DAP	1 بوری SOP	1/2 بوری یوریا
پنیری منتقلی کے 10 دن بعد	-	1/2 بوری SOP	1/2 بوری یوریا
پنیری منتقلی کے 20 دن بعد	-	1/2 بوری SOP	1 بوری نائٹرو فاس
پنیری منتقلی کے 30 دن بعد	-	-	1 بوری یوریا

(پنیری منتقلی کے (35-40) دن کے بعد بوران کا استعمال فصل کے لیے انتہائی مفید ہے)

یاد رکھیں! کھادوں کے استعمال میں 10-20-30 دن کی سفارشات پر عمل کریں اور بہترین نتائج حاصل کریں۔

*نوٹ: زمین کی ساخت، زرخیزی اور فصل کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے کھاد کی مقدار کم یا زیادہ کی جاسکتی ہے



نام: محمد یونس
پتہ: 29 ضلع پاک پتن

مجھے گو بھی لگاتے ہوئے 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں۔ پہلے میں دیسی گو بھی لگاتا تھا جو زیادہ عرصہ میں تیار ہوتی تھی اور اسکے پھول جھاڑی نما بن جاتے تھے۔ موسم کے اثرات کو دیکھتے ہوئے سنجینٹا کی CFH-1522 کے بارے میں پتا چلا۔ میں نے دیسی اور CFH-1522 دونوں ایک ہی دن کاشت کیے۔ دیسی کو ایک کنال پہ لگایا اور CFH-1522 کو چار کنال پر۔ اس ایک کنال سے اب تک بمشکل 10% چنائی ہو سکی اور 1522 10% کھڑی ہے۔ CFH-1522 کا پھول انتہائی گوندھا ہوا ہے۔ جس کو گاہک بہت پسند کرتا ہے۔ اور اس کا وزن بھی بہت اچھا ہے اور موسمی اثرات کی تبدیلی کے لحاظ سے درجہ حرارت پچھلے سال کی نسبت کافی بڑھا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا کوئی دیسی بیج بہتر کارکردگی نہ کر سکا ان حالات میں سب سے بہتر سنجینٹا کا CFH-1522 رہا۔



نام: محمد اشفاق
پتہ: چک نمبر 29 ایس پی ضلع پاک پتن

میں تقریباً 4 سے 5 سال سے دیسی گو بھی لگا رہا ہوں۔ اس مرتبہ ہم نے سنجینٹا کا CFH-1522 لگایا یہ گرمی برداشت کرتا ہے۔ اور اسکا ہر پودہ تیار اور منڈی میں لے جانے کے قابل ہوتا ہے۔ اسکا پھول بھی گوندھا ہوا ہے اور یہ 3 سے 4 چنائیوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو منڈی میں بیج کر اگلی فصل لگا سکتے ہیں۔ ہم نے دیسی ورائٹی بھی لگائی اور وہ ابھی تک 90% تک کھڑی ہے اور CFH-1522 ہم نے 90% چنائی کر لی ہے۔ سنجینٹا کا CFH-1522 بیج لگاؤ اور ہماری طرح بہتر منافع کماؤ۔

CFH-1522

syngenta®